

ALLEGATO A)**AVVERTENZE**

Il test HIV permette di accertare, attraverso la ricerca degli anticorpi anti-HIV, se è avvenuta o meno l'infezione da virus HIV.

Il risultato negativo significa che nel sangue non sono stati riscontrati questi anticorpi e che quindi non è avvenuta l'infezione.

È importante sapere che l'organismo impiega da tre settimane fino a sei mesi per produrre anticorpi anti-HIV ("periodo finestra"). Se si esegue il test durante il "periodo finestra" la persona potrebbe essere infetta ma risultare negativa perché non ha ancora prodotto gli anticorpi.

Pertanto si consiglia di ripetere il test dopo che sono trascorsi 6 mesi dal comportamento a rischio.

L'infezione da virus HIV si trasmette con le seguenti modalità:

1. contatto sessuale;
2. contatto con sangue infetto;
3. dalla madre al bambino.

Per evitare di contrarre l'infezione:

- usare il profilattico durante i rapporti sessuali;
- non scambiare strumenti per iniettare droghe;
- eseguire il test HIV in fase pre-concezionale.

La ripetizione di comportamenti a rischio espone a rischio di futuro contagio, anche se il primo test HIV è risultato negativo.

Evitare i comportamenti a rischio è possibile. Per spiegazioni, domande, informazioni potete contattare i Centri di malattie infettive, i Centri per le malattie trasmesse sessualmente e le associazioni di volontariato che si occupano del problema.

Spazio per inserire recapito dei Centri malattie infettive, MST e associazioni della zona