



## ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE IT110013 - MONTI PELATI

### PIANO DI GESTIONE 2017

## CARTA DEGLI HABITAT

Classificazione secondo  
CORINE Biotopes e Natura 2000 (All. I Dir. 92/43/CEE)



### RETE NATURA 2000

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992  
D.P.R. n. 357 del 08 settembre 1997  
L.R. n. 19 del 29 giugno 2009

### Allegato C




Rilevamenti sul terreno: Anno 2009

Fotointerpretazione basata su immagini telerilevate del 2007

Cartografia realizzata nel mese di Giugno 2017

Fondo topografico: Ingrandimento alla scala 1:4.000 della CTP raster della Città Metropolitana di Torino



## tematismi specifici

| Habitat 1 | Habitat 2 | Habitat 3 | Caratteristiche e localizzazione   |
|-----------|-----------|-----------|--|
| 6210      | 6410      | 6130      | Praterie erbose secche (6210), intervallate da formazioni a molina nelle micro-stazioni con maggiore umidità (6410) e formazioni erbose calaminari (6130) sugli affioramenti rocciosi che emergono dalla prateria, con piccoli gruppi di calluna |
| a         | 6410      | 6210      | Mosaico tra praterie a molina (6410) ed praterie erbose secche (6210), in mosaico con formazioni erbose calaminari (6130)  |
| a         | 6130      | 6210      | Affioramenti rocciosi con formazioni erbose calaminari (6130), in mosaico con praterie erbose secche (6210) e brughera a calluna (4030)  |
| b         | 6410      | 6130      | Praterie a prevalenza di molina (6410) in mosaico con affioramenti rocciosi (6130) e brughera a calluna (4030)   |
| b         | 6130      | 6410      | Affioramenti rocciosi con formazioni erbose calaminari (6130), in alternanza a praterie a molina (6410) e nuclei di brughera a calluna (4030)  |
| 6510      |           |           | Prati stabili di pianura   |

### Altri ambienti

|  |   |
|--|---|
|  | Boscaglie d'invasione a prevalenza di betulla e pino tremolo (B520X) o miste di Salix caprea, Corylus avellana, Acer campestre con subordinata presenza di Robinia pseudoacacia e Alnus altissima |
|  | Acereti d'invasione su coltivi e prati stabili abbandonati  |
|  | Popolamenti a prevalenza di Robinia pseudoacacia o Alnus altissima, in mescolanza con latifoglie autoctone, localmente pino nero e pino silvestre   |
|  | Popolamenti artificiali a prevalenza di Larix decidua o Pinus nigra o Pinus strobus, talora con uno strato inferiore di latifoglie autoctone o esotiche   |
|  | Impianti di arboricoltura da legno  |
|  | Coltivi abbandonati con prevalenza di Rhus spp.   |
|  | Frutteti e vigneti  |
|  | Affioramenti rocciosi ed aree calanchive  |
|  | Urbani e impianti estrattivi  |

Punti di localizzazione di specie di interesse con relativo codice identificativo

Ag - Alnus glutinosa  
Cae - Carpinus betulus  
Jco - Juniperus communis  
Qpu - Quercus pubescens

91E0 - Formazioni lineari a presenza di frassino maggiore e ontano nero, in mescolanza con altre latifoglie mesofile autoctone ed arbustive

