



RETE NATURA 2000

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992
D.P.R. n. 357 del 08 settembre 1997
L.R. n. 19 del 29 giugno 2009

Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" del 30 novembre 2009
L. n. 157 dell'11 febbraio 1992
L. n. 96 del 4 giugno 2010
L.R. n. 70 del 4 settembre 1996

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE

IT1140006 - GRETO DEL TORRENTE TOCE
TRA DOMODOSSOLA E VILLADOSSOLA



PIANO DI GESTIONE

Finanziamento PSR 2007/2013 – Misura 323 azione 1


CARTA DEGLI HABITAT
Legenda

classificazione secondo
CORINE Biotopes e Natura 2000 (All. I Dir. 92/43/CEE)

Inquadramento sezioni CTR 1:10.000



Limiti amministrativi



Cartografia realizzata nel mese di novembre 2012

Fondo topografico: CTR raster della Regione Piemonte scala 1:10.000

Codice carta	Definizione	Codice Habitat Natura 2000
Habitat Natura 2000		
	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> e <i>Hydrocharition</i>	[3150]
	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea prevalente in mosaico con: Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i> , e Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>	[3220] [3230] [3240]
	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i> prevalente in mosaico con: Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i> e Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	[3240] [3230] [3220]
	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e del <i>Callitricho-Batrachion</i>	[3260]
	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) prevalente in mosaico con: Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i> Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	[6210] [3240] [3220]
	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>) prevalente in mosaico con: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>)	[6510] [6210]
	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Salicion albae</i>)	[91E0*]
Altri Ambienti		
	Acque ferme e correnti	
	Boscaglie d'invasione con prevalente betulla, biancospino, berberis e con la presenza di specie alloctone arboreo-arbustive (robinia e buddleja) ed erbacee	
	Boschi di robinia puri o in variante con latifoglie mesofile	
	Coltivi abbandonati	
	Aree estrattive	
	Seminativi	
	Zone urbanizzate	