



RETE NATURA 2000

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992
D.P.R. n. 357 del 08 settembre 1997
L.R. n. 19 del 29 giugno 2009

Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" del 30 novembre 2009
L. n. 157 dell'11 febbraio 1992
L. n. 96 del 4 giugno 2010
L.R. n. 70 del 4 settembre 1996

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE

IT1120013 - ISOLOTTO DEL RITANO (DORA BALTEA)



PIANO DI GESTIONE

Finanziamento PSR 2007/2013 – Misura 323 azione 1


CARTA DEGLI HABITAT Legenda

classificazione secondo
CORINE Biotopes e Natura 2000 (All. I Dir. 92/43/CEE)

Inquadramento sezioni CTR 1:10.000



Limiti amministrativi



| | Definizione | CORINE Biotopes | Natura 2000 |
|---|---|-----------------------------|-------------|
| CORSI D'ACQUA | | | |
| | Corsi d'acqua e letti dei corsi d'acqua | 24.100000 | |
| | Greti dei corsi d'acqua non vegetati | 24.210000 | |
| | Greti dei corsi d'acqua di pianura, vegetati | 24.226000 | |
| | con comunità arbustive a <i>Salix</i> spp (prevalenza <i>S. eleagnos</i>) | 24.223000 | 3240 |
| ARBUSTETI | | | |
| | Arbusteti basali e montani, neutro-basifili, d'invasione | 31.810000 | |
| PRATERIE | | | |
| | Praterie basali e montane, acidofile, xerofile, del <i>Diplachnion</i> | 35.160000 | 6230* |
| BOSCHI | | | |
| Boschi mesofili e mesoxerofili | | | |
| | Saliceti di salice bianco | 44.130000 | 91E0* |
| | Pioppeto-saliceti giovani del <i>Salicion albae</i> (<i>Salici-Populetum nigrae</i>) | 44.131100 | 91E0* |
| | con popolamenti di robinia d'invasione | 41.H10000 | |
| | Saliceti a <i>Salix daphnoides</i> | 44.112000 | 3240 |
| | Boschi a legno duro ripari lungo i grandi fiumi (<i>Ulmion</i>) | 44.440000 | 91F0 |
| | con popolamenti di robinia d'invasione | 41.H10000 | |
| | Popolamenti di olmo campestre | 41.F10000 | |
| Boschi mesoigrofilii | | | |
| | Alneti di ontano nero in mescolanza con ontano bianco | 44.300000 | 91E0* |
| | Saliceti paludosi a <i>Salix cinerea</i> | 44.921000 | |
| Altri boschi antropogeni | | | |
| | Robineti in mosaico con boschi mesofili | 41.H10000 | |
| | Popolamenti di ailanto in mosaico con boschi mesofili | 41.HA0000 | |
| COMUNITÀ ERBACEE DELLE TORBIERE E PALUDI | | | |
| | Comunità erbacee/canneti a <i>Phragmites australis</i> con Comunità erbacee di aree umide, a grosse <i>Carex</i> spp. e <i>Cyperus</i> spp. | 53.110000 e 53.200000 | |
| AMBIENTI AGRICOLI | | | |
| | Seminativi intensivi (mais, soia ecc.) | 82.100000 | |
| ARBORICOLTURA DA LEGNO | | | |
| | Pioppeti euroamericani | 83.321000 | |
| | con popolamenti di robinia d'invasione | 41.H10000 | |
| | con campi non coltivati | 87.100000 | |
| INCULTI – VEGETAZIONE ERBACEA RUDERALE | | | |
| | Campi non coltivati | 87.100000 | |
| | Comunità di alte erbe nitrofile o ruderali | 87.200000 | |
| | con popolamenti di robinia d'invasione | 41.H10000 | |
| | con popolamenti di ailanto | 41.HA0000 | |
| AMBIENTI ANTROPICI | | | |
| | Parchi e giardini | 85.000000 | |
| | Aree urbane | 86.000000 | |