

## **CODIFICA DEI SINTOMI FLAVESCENZA DORATA**

- S1)** tracce del germogliamento irregolare primaverile con “germogli striminziti” dal capo a frutto;
- S2)** “germogli striminziti” cioè con internodi accorciati, andamento a zig-zag e foglie piccole e/o bollose (più avanti nella stagione rispetto al germogliamento e non riferibili ai primi germogli derivanti dal capo a frutto);
- S3)** arrossamenti o ingiallimenti attorno alle nervature delle foglie (se avvengono a inizio stagione le foglie colpite si staccano dopo poco, picciolo compreso);
- S4)** disseccamento delle infiorescenze e dei grappoli in varie fasi di sviluppo fino alla chiusura (se avviene precocemente, dopo un po' il grappolo secco si stacca);
- S5)** arrossamenti o ingiallimenti di settori di foglia delimitati dalle nervature principali;
- S6)** distacco anticipato delle lamine fogliari con permanenza del picciolo sul tralcio;
- S7)** appassimento anche solo di porzioni di grappolo dopo la chiusura;
- S8)** aspetto flessuoso e gommoso del germoglio e difficoltà nella lignificazione;
- S9)** marcato ripiegamento dei lembi fogliari verso il basso, cioè accartocciamento a triangolo, sin dalla tarda primavera pressoché simultaneo su tutte le foglie dello stesso tralcio (tale sintomo non deve essere confuso con l'accartocciamento di tipo virale che compare solo dall'estate e colpisce prima le foglie più vecchie ed è associato ad arrossamenti che iniziano dai margini fogliari);
- S10)** ispessimento della lamina fogliare, consistenza cartacea.