



**Fabaceae (Leguminosae)**

## ***Amorpha fruticosa* L.**

### **Sinonimi:**

*Amorpha croceolanata* Watson, *A. elata* Hayne, *A. fragrans* Sweet, *A. pendula* Carrière, *A. pubescens* Schlecht

### **Nomi comuni**

Italiano: Indaco bastardo, Amorfa, Amorfa cespugliosa, Falso indaco.

Inglese: Indigo-bush, False indigo, Bastard indigo-bush.

Nomi dialettali piemontesi: /



[1] Foto A. Mingozi



[2] Foto N. Vinals



[3] Foto N. Vinals



[4] Foto A. Mingozi



[5] Foto E. Barni



[6] Foto D. Bouvet

La riproduzione anche parziale della presente scheda è permessa a condizione che se ne citi la fonte come segue:

Gruppo di Lavoro Specie Esotiche della Regione Piemonte (a cura del), 2015.

Scheda monografica *Amorpha fruticosa*.

Regione Piemonte, Torino.

## ORIGINE

### Zona geografica di origine della specie


America settentrionale.

### Periodo e modalità di introduzione

Specie neofita, introdotta in Europa a scopo ornamentale nel XVIII secolo; è stata coltivata a partire dal 1724 in Inghilterra e in Francia, poi utilizzata per siepi e consolidamento dei terreni; si sarebbe spontaneizzata a partire dal 1750.


In Italia è stata coltivata dalla seconda metà del XVIII secolo (nel 1760 era coltivata nell'orto Botanico di Torino); si è spontaneizzata probabilmente a partire dalla metà del XIX secolo, in Lombardia e in Friuli-venezia Giulia (Bouvet *et al.*, 2013).

## DISTRIBUZIONE



**Distribuzione altitudinale m s.l.m. (minima, mediana, massima):** 70 (200) 750

**Istogramma distribuzione altitudinale:**



## STATUS IN ITALIA



## LISTE NERE

INV	DAISIE ( 100 WORST)
INV	LISTA NERA REG. LOMBARDIA (L.R. 10/08)
INV	LISTA NERA CPS-SKEW
INV	LISTA NERA EPP0