

## ***Popillia japonica*, una specie in progressiva diffusione**

di **Giovanni Bosio, Enzo Piazza,  
Emanuela Giacometto**

**L**a prima segnalazione della presenza del coleottero scarabeide *Popillia japonica* Newman nell'Italia settentrionale risale ad alcuni anni fa (Pavesi, 2014). L'area infestata, a partire dal focolaio iniziale lungo le sponde del Ticino, tra le province di Novara e Varese, coin-

segnalata per la prima volta nel 2014, *Popillia japonica* sta continuando la progressiva diffusione in nuove aree e nei relativi ecosistemi. L'assenza di limitatori naturali impone la conoscenza del ciclo biologico, delle preferenze alimentari e delle condizioni che favoriscono la moltiplicazione per definire le linee di intervento più idonee per limitare i danni

### ***Popillia japonica*, una specie in progressiva diffusione**

di Giovanni Bosio, Enzo Piazza, Emanuela Giacometto

n. 21/2022 • L'Informatore Agrario

Per leggere l'articolo cliccare sul link:

[https://drive.google.com/file/d/1w7PwbmuEB5US\\_brqT3j-EwopZbS9JDQB/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1w7PwbmuEB5US_brqT3j-EwopZbS9JDQB/view?usp=sharing)