

Prescrizione

Indicazione: Trattamento degli attacchi acuti di angioedema ereditario		
Farmaco	Posologia	Durata
RUCONEST 2100 U - polvere e solvente per soluzione iniettabile- uso endovenoso, polvere 2100 U, 1 flaconcino (vetro); solvente 20 ml, 1 flaconcino (vetro); + 2 adattatori per flaconcino + 1 siringa + 1 set per infusione con ago + 2 tamponi imbevuti di alcol + 1 tampone sterile in tessuto non tessuto + 1 cerotto adesivo.		
<p><u>Posologia in adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore a 2 anni</u></p> <p><i>Pazienti di peso corporeo fino a 84 kg</i> - Una iniezione endovenosa di 50 U/kg di peso corporeo.</p> <p><i>Pazienti di peso corporeo pari a 84 kg o oltre</i> - Una iniezione endovenosa di 4200 U (2 flaconcini).</p> <p>In caso di insufficiente risposta clinica, può essere somministrata una dose aggiuntiva (50 U/kg di peso corporeo fino a 4200 U) a discrezione del medico.</p> <p>- Negli adulti e adolescenti può essere somministrata una dose aggiuntiva se il paziente non ha risposto correttamente dopo 120 minuti.</p> <p>- Nei bambini può essere somministrata una dose aggiuntiva se il paziente non ha risposto correttamente dopo 60 minuti.</p> <p>Nelle 24 ore non devono essere somministrate più di due dosi.</p> <p>Ruconest è controindicato in caso di allergia nota o sospetta al coniglio o ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.</p>		

Validità del Piano terapeutico: _____ mesi

La validità massima del Piano Terapeutico è di dodici mesi, oltre i quali sarà possibile rinnovare la prescrizione compilando un nuovo Piano Terapeutico.

La prescrizione va effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

Data valutazione: ___/___/_____

Data scadenza PT: ___/___/_____

Timbro e firma del medico prescrittore

