

DISERBO DELL'ASPARAGO				
(*) <u>Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione (indicate in corsivo, grigio, grassetto): 3</u> Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi)				
EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	HRAC	DOSE E LIMITAZIONE D'USO
Pre trapianto Pre ricaccio e/o Post raccolta	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	G	Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
		Acido pelargonico	NC	
Pre ricaccio	Dicotiledoni	Dicamba	O	
	Graminacee e Dicotiledoni	<i>Pendimetalin</i> (*)	K1	Da usare solo su asparagiaia impiantata di almeno 2 anni.
Pre emergenza	Dicotiledoni e Graminacee annuali	<i>Metribuzin</i> (*)	C1	Scadenza impiego: 24/11/2025.
Post emergenza Post trapianto	Graminacee	Propaquizafop	A	
		Fluazifop-p-butile	A	
		Cletodim	A	
Post trapianto Post raccolta	Dicotiledoni	Piridate	C3	Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti.
	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico	NC	In presenza della coltura usare attrezzature protettive (schermi o campane).
Post raccolta	Dicotiledoni e alcune Graminacee	Metobromuron	C2	
	Dicotiledoni	2,4 D		
	Dicotiledoni e Graminacee annuali	Clomazone	F3	Solo in miscela.
		<i>Pendimetalin</i> (*)	K1	Solo in miscela.

(1) Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Laddove possibile alternare tra loro molecole con differente meccanismo d'azione (non basta cambiare il Prodotto commerciale) cioè che hanno un diverso codice HRAC (vedi tabella coltura e All. IV parte introduttiva).