

## PRATI (graminacee e polifiti)

| RIFERIMENTO DELLE NORME GENERALI  | NORME COLTURALI  |
|---|--|
| Scelta dell'ambiente di coltivazione e vocazionalità                        | Nessun vincolo specifico; indirizzi generali e consigli in "Norme Generali – <b>Punto 3</b> ".   |
| Mantenimento dell'agroecosistema naturale                                   | Vincoli, indirizzi generali e consigli in "Norme Generali - <b>Punto 4</b> ".  |
| Scelta varietale e materiale di moltiplicazione                             | <b>Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM). Devono essere utilizzate sementi “certificate” ad eccezione di quanto previsto nei casi particolari elencati nella parte generale.</b><br>Vincoli, indirizzi generali e consigli in "Norme Generali - <b>Punto 5</b> ".  |
| Sistemazione e preparazione del suolo all'impianto e alla semina            | Nessun vincolo specifico; indirizzi generali e consigli in "Norme Generali - <b>Punto 6</b> ".   |
| Avvicendamento colturale  | Nel caso di adesione a programmi pluriennali (Reg. UE n. 2021/2115) si deve adottare una rotazione quinquennale che comprenda almeno tre colture (vedi. Norme Generali - <b>Punto 7</b> ).<br>Come previsto nella parte generale, <b>per le colture erbacee foraggere pluriennali, è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda solo due colture.</b><br>Le colture erbacee poliennali tecnicamente non avvicendabili non sono soggette ai vincoli rotazionali.<br><b>Le colture erbacee foraggere di durata pluriennale non possono essere seguite dalla medesima coltura (divieto di ristoppio della stessa specie prevalente).</b><br>Vincoli, indirizzi generali e ulteriori chiarimenti su avvicendamenti specifici in "Norme Generali - <b>Punto 7</b> ".  |
| Semina, trapianto, impianto   | Nessun vincolo specifico; indirizzi generali e consigli in "Norme Generali - <b>Punto 8</b> ".   |
| Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti | <b>Vincoli per le lavorazioni nei terreni con pendenza superiore al 10%: vedi "Norme generali - Punto 9"</b>   |
| Gestione della pianta e della fruttificazione                               | Vincoli, indirizzi generali e consigli in "Norme Generali - <b>Punto 10</b> ".   |
| Fertilizzazione   | L'azienda deve disporre delle informazioni relative alle caratteristiche chimico-fisiche del terreno che ospita il prato tramite l'effettuazione di <b>analisi</b> in conformità a quanto previsto dalle Norme Generali - <b>Allegato I</b> . L'azienda è tenuta a redigere un <b>Piano di Concimazione</b> (vedi Allegato I) o, in alternativa adottare il modello semplificato secondo le <b>Schede a Dose Standard</b> . In caso d'utilizzo delle Schede a Dose Standard l'azienda è tenuta a registrare le motivazioni d'incremento o decremento degli apporti barrando le opportune caselle. Per l'azoto l'incremento massimo è indicato nella colonna “Note incrementi” della scheda.<br>Il riscontro delle operazioni di concimazione è dato dalla scheda di magazzino e dalla scheda “Registrazione degli interventi”.<br>La distribuzione di concimi azotati minerali deve essere frazionata per apporti superiori a 100 kg/ha.<br>La distribuzione autunnale di <b>azoto in pre-semina</b> in forma minerale <b>è ammessa solo nel caso di utilizzo di concimi contenenti più elementi nutritivi e con un apporto di azoto inferiore a 15 Kg/ha</b> e in forma organo minerale nei casi previsti al par “Casi particolari” dell'Allegato I. In copertura la distribuzione di azoto è consentita a partire dal 15 febbraio. Valgono inoltre eventuali norme più restrittive derivanti dal Reg. 10/R e s.m.i. (recepimento della direttiva nitrati).<br>È sconsigliata la distribuzione di letame in copertura, per la minore efficienza d'uso dell'azoto dovuta alla volatilizzazione dell'ammoniaca.<br>Vincoli, indirizzi generali e consigli in "Norme Generali - <b>Punto 11</b> " e " <b>Allegato I</b> ". |
| Irrigazione   | L'irrigazione per scorrimento, metodo a bassa efficienza irrigua, è ammissibile solo se vengono adottate le precauzioni necessarie alla massima riduzione degli sprechi.<br>L'azienda deve obbligatoriamente adottare il metodo base rispettando il volume massimo per ogni intervento irriguo indicato in "Norme Generali - <b>Punto 14</b> " o preferibilmente, uno dei tre metodi di gestione irrigua descritti in " <b>Allegato II</b> ".  |
| Raccolta  | <b>Solo per Marchio SQNPI: i prodotti devono essere sempre identificati al fine di permetterne la rintracciabilità, in modo da renderli facilmente distinguibili rispetto ad altri ottenuti con modalità produttive diverse.</b> Vedi "Norme Generali - <b>Punto 16</b> ".   |

## PRATI (graminacee e polifiti) alta produzione - CONCIMAZIONE

### Scheda a dose standard

|   | <b>Note decrementi</b>   | Apporto standard (N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O) in situazione normale per una produzione di: <b>10-13 t/ha di fieno</b> | <b>Note incrementi</b>   |
|---|--|--|--|
|   | Quantitativo (N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O) da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni:<br><br>(barrare le opzioni adottate)  |  | Quantitativo (N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O) che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni.<br><br>(barrare le opzioni adottate)   |
| <b>N - Azoto</b>                            | <input type="checkbox"/> <b>-40 kg:</b> se si prevedono produzioni inferiori a 10 t/ha<br><input type="checkbox"/> <b>-20 kg:</b> in caso di elevata dotazione di sostanza organica (All.I Fertilizzazione - interpretazione delle analisi)<br><input type="checkbox"/> <b>-30 kg:</b> in caso di apporti di letame l'annata precedente<br><input type="checkbox"/> <b>-30 kg:</b> in caso di successione a leguminose<br><input type="checkbox"/> <b>-80 kg:</b> in caso di successione a medica o prati > 5 anni<br><input type="checkbox"/> <b>-40 Kg:</b> con presenza di leguminose | <b>DOSE STANDARD: 200 kg/ha di N</b>   | <input type="checkbox"/> <b>30 kg:</b> se si prevedono produzioni superiori a 13 t/ha<br><input type="checkbox"/> <b>20 kg:</b> in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (All.I Fertilizzazione - interpretazione delle analisi)<br><input type="checkbox"/> <b>15 kg:</b> in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es. pioggia superiore a 300 mm nel periodo ottobre-febbraio)<br><br><b>Incremento massimo: 50 kg/ha</b> |
| <b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> - Fosforo</b> | <input type="checkbox"/> <b>-70 kg:</b> in caso di terreni con dotazione elevata<br><input type="checkbox"/> <b>-15 kg:</b> se si prevedono produzioni inferiori a 10 t/ha   | <b>DOSE STANDARD: 80 kg/ha di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b>   | <input type="checkbox"/> <b>15 kg:</b> se si prevedono produzioni superiori a 13 t/ha<br><input type="checkbox"/> <b>10 kg:</b> nel caso di concimazioni prevalentemente organiche   |
| <b>K<sub>2</sub>O - Potassio</b>            | <input type="checkbox"/> <b>-50 kg:</b> se si prevedono produzioni inferiori a 10 t/ha<br><input type="checkbox"/> <b>-180 kg:</b> in caso di terreni con dotazione elevata  | <b>DOSE STANDARD: 180 kg/ha di K<sub>2</sub>O</b>  | <input type="checkbox"/> <b>40 kg:</b> se si prevedono produzioni superiori a 13 t/ha  |

**PRATI (graminacee e polifiti) bassa produzione - CONCIMAZIONE**  
**Scheda a dose standard**

|   | <b>Note decrementi</b>   | Apporto standard (N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O) in situazione normale per una produzione di: <b>5-7 t/ha di fieno</b> | <b>Note incrementi</b>  |
|---|--|--|---|
|   | Quantitativo (N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O) da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni:<br><br>(barrare le opzioni adottate)  |  | Quantitativo (N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O) che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni.<br><br>(barrare le opzioni adottate)  |
| <b>N - Azoto</b>                            | <input type="checkbox"/> <b>-40 kg:</b> se si prevedono produzioni inferiori a 5 t/ha<br><input type="checkbox"/> <b>-20 kg:</b> in caso di elevata dotazione di sostanza organica (All.I Fertilizzazione - interpretazione delle analisi)<br><input type="checkbox"/> <b>-30 kg:</b> in caso di apporti di letame l'annata precedente<br><input type="checkbox"/> <b>-30 kg:</b> in caso di successione a leguminose<br><input type="checkbox"/> <b>-80 kg:</b> in caso di successione a medicai o prati > 5 anni<br><input type="checkbox"/> <b>-40 Kg:</b> con presenza di leguminose | <b>DOSE STANDARD: 110 kg/ha di N</b>   | <input type="checkbox"/> <b>30 kg:</b> se si prevedono produzioni superiori a 7 t/ha<br><input type="checkbox"/> <b>20 kg:</b> in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (All.I Fertilizzazione - interpretazione delle analisi)<br><input type="checkbox"/> <b>15 kg:</b> in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es. pioggia superiore a 300 mm nel periodo ottobre-febbraio)<br><br><b>Incremento massimo: 50 kg/ha</b> |
| <b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> - Fosforo</b> | <input type="checkbox"/> <b>-40kg:</b> in caso di terreni con dotazione elevata<br><input type="checkbox"/> <b>-15 kg:</b> se si prevedono produzioni inferiori a 5 t/ha   | <b>DOSE STANDARD: 40 kg/ha di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b>   | <input type="checkbox"/> <b>15 kg:</b> se si prevedono produzioni superiori a 7 t/ha<br><input type="checkbox"/> <b>10 kg:</b> nel caso di concimazioni prevalentemente organiche   |
| <b>K<sub>2</sub>O - Potassio</b>            | <input type="checkbox"/> <b>-50 kg:</b> se si prevedono produzioni inferiori a 5 t/ha<br><input type="checkbox"/> <b>-120 kg:</b> in caso di terreni con dotazione elevata   | <b>DOSE STANDARD: 120 kg/ha di K<sub>2</sub>O</b>  | <input type="checkbox"/> <b>40 kg:</b> se si prevedono produzioni superiori a 7 t/ha  |