

Nella seguente tabella sono riportati i risultati delle analisi con la distribuzione dei campioni nelle 3 categorie definite dalla National Academies of Science (NAS) sulla base della concentrazione degli 7 *Pfas*. Non tutti gli studi hanno analizzato tutti e 7 i PFAS “normati”

Valori riscontrati	Numero soggetti per categoria sommatoria 7 Pfas prevista dalla National Academies of Science (NAS)	
< 2 µg/l		
ASL Studio pilota su 29 soggetti aderenti	1	
ASL Prima coorte 3 km (500 m) Soggetti aderenti n.135	7	
Studio indipendente Liegi alto rischio di esposizione Analisi su 31 soggetti	0	
Studio indipendente Liegi basso rischio di esposizione Analisi su 21 soggetti	1	
Studio indipendente Acquisgrana analisi su 30 soggetti	0	
tra 2 e 20 µg/l		
ASL Studio pilota su 29 soggetti aderenti	22	1 4
ASL Prima coorte 3 km (500 m) Soggetti aderenti n.135	113	
Studio indipendente Liegi alto rischio di esposizione Analisi su 31 soggetti	21	

Liegi basso rischio di esposizione Analisi su 21 soggetti	19	
Studio indipendente Acquisgrana Analisi su 36 soggetti	31	
> 20 µg/l		
ASL Studio pilota su 29 soggetti aderenti	6	7
ASL Prima coorte 3 km (500 m) Soggetti aderenti n.135	15	
Studio indipendente Liegi alto rischio di esposizione Analisi su 31 soggetti	10	
Studio indipendente Liegi basso rischio di esposizione Analisi su 21 soggetti	1	
Studio indipendente Acquisgrana Analisi su 36 soggetti	5	