

## Batteriosi dell'actinidia in Piemonte

### Interventi di carattere generale in presenza accertata della malattia

OBIETTIVO	AZIONI CONSEGUENTI
Contenere la diffusione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Segnare le piante che presentano sintomi riconducibili alla batteriosi e rimondarle dalle parti colpite quanto prima preferendo giornate asciutte.</li><li>• Disinfettare dopo ogni uso con sali di ammonio quaternario (benzalconio cloruro) gli attrezzi impiegati per il taglio delle parti di pianta malate.</li><li>• Coprire i grossi tagli di rimonda con colle viniliche addizionate di rame.</li><li>• Accumulare <i>in loco</i> le parti sintomatiche asportate, cospargerle di calce e coprirle con telo plastico trasparente in alternativa alla combustione, difficilmente praticabile, o all'interramento profondo.</li><li>• Effettuare le operazioni di potatura (anche verde) quando la vegetazione è asciutta.</li></ul>

Per i dettagli sulle operazioni suscettibili di aggiornamento si rimanda alla consultazione delle "linee guida permanenti", consultabili ai seguenti indirizzi:

- [http://www.regione.piemonte.it/agri/set\\_fitosanit/fitopatologia/avversita/org\\_allerta.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/set_fitosanit/fitopatologia/avversita/org_allerta.htm)
- <http://www.cresoricerca.it/>