

DISERBO DEL COLZA				
(*) Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione (indicate in corsivo, grigio, grassetto): 2 Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi)				
EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	HRAC	DOSE E LIMITAZIONE D'USO
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	9	Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture occorre tener conto, sommandole, di tutte le quantità di glifosate distribuite.
		Acido pelargonico	0	
	Graminacee e alcune Dicotiledoni annuali Cyperus spp.	Napropamide	0	Preparare definitivamente il terreno circa un mese prima della semina. Incorporare al terreno con mezzi meccanici, con l'irrigazione o impiegare dopo abbondanti precipitazioni.
Pre emergenza	Graminacee ed alcune Dicotiledoni annuali	Metazaclor	15	Sullo stesso appezzamento non distribuire più di 1 kg di s.a. ogni 3 anni.
		Clomazone	13	Solo in miscela. Al massimo 1 trattamento all'anno.
	Dicotiledoni e Graminacee annuali	<i>Pendimetalin (*)</i>	3	Solo in miscela. Al massimo 1 trattamento all'anno.
Post emergenza	Graminacee e alcune Dicotiledoni annuali	Metazaclor	15	Sullo stesso appezzamento non distribuire più di 1 kg di s.a. ogni 3 anni.
		<i>Imazamox (*)</i>	2	Impiegabile esclusivamente su varietà tolleranti agli erbicidi imidazolinoni (AHAS) secondo le indicazioni delle etichette dei singoli prodotti fitosanitari. Impiego 1 volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.
	Dicotiledoni	Clopiralid	4	
		Aminopirialid	4	
		Halauxifen-metile	4	S.a. impiegabili in miscela su colza invernale. Al massimo 1 trattamento ogni 2-3 anni in funzione del dosaggio impiegato. Formulato con antidoto.
		Picloram	4	
	Graminacee ( <i>Echinochloa</i> spp., <i>Avena</i> spp., ricacci di frumento)	Ciclossidim	1	
		Propaquizafop	1	
		Quizalofop p etile	1	
		Fluazifop p butile	1	
		Cletodim	1	

(1) Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Laddove possibile alternare tra loro molecole con differente meccanismo d'azione (non basta cambiare il Prodotto commerciale) cioè che hanno un diverso codice HRAC (vedi tabella coltura e All. IV parte introduttiva).