

DISERBO DEL POMODORO DA INDUSTRIA

(*) Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione (indicate in corsivo e grigio): 2

Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi)

| EPOCA | INFESTANTI | SOSTANZA ATTIVA | HRAC | DOSE E LIMITAZIONE D'USO |
|----------------------------------|---|-------------------------|------|--|
| Pre semina e Pre trapianto | Graminacee e Dicotiledoni | Glifosate (1) | 9 | Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2l per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ L/ha} \times n$ ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. Nel caso di due colture /anno sulla stessa sup. la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture occorre tener conto, sommandole, di tutte le quantità di glifosate distribuite. |
| | | Acido pelargonico | 0 | |
| | Graminacee e alcune Dicotiledoni annuali Cyperus spp. | Napropamide | 0 | Preparare definitivamente il terreno circa un mese prima della semina. Incorporare al terreno con mezzi meccanici, con l'irrigazione o impiegare dopo abbondanti precipitazioni. |
| | | | | |
| Pre trapianto | Graminacee e Dicotiledoni | <i>Pendimetalin (*)</i> | 3 | |
| | | | | |
| | Graminacee e alcune Dicotiledoni annuali | <i>Flufenacet (*)</i> | 15 | In miscela impiegabile sulla stessa particella 1 volta ogni 3 anni. Scadenza impiego: 10/06/2026. |
| | | | | |
| | Dicotiledoni | <i>Aclonifen (*)</i> | 32 | Impiegabile al massimo 1 volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dal fatto che venga applicato su mais, sorgo, pomodoro, girasole e soia. |
| | | Pirafufen etile | 14 | Al massimo 1 trattamento all'anno tra pre e post trapianto. Impiegare schermatura. |
| | Dicotiledoni | Bifenox | 14 | |

| EPOCA | INFESTANTI | SOSTANZA ATTIVA | HRAC | DOSE E LIMITAZIONE D'USO |
|---|---------------------------------|----------------------|------|--|
| Pre emergenza Trattamenti localizzati sulla fila. L'area trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie | Dicotiledoni | <i>Aclonifen</i> (*) | 32 | Impiegabile al massimo 1 volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dal fatto che venga applicato su mais, sorgo, pomodoro, girasole e soia. |
| | | | | |
| Post emergenza Intervenire precocemente alla prima comparsa delle infestanti con trattamenti localizzati sulla fila associati a lavorazioni nell'interfila | Graminacee e Dicotiledoni | Rimsulfuron | 2 | In caso di infestazioni di orobanche prestare attenzione alla pulizia delle macchine. Individuare gli appezzamenti infestati e segnalarlo a eventuali terzisti. |
| | Graminacee | Ciclossidim | 1 | Intervenire con trattamenti localizzati associati a lavorazioni nell'interfila. Non trattare dopo la fase di inizio fioritura. |
| | | Cletodim | 1 | |
| | | Quizalofop-p-etile | 1 | |
| | | Propaquizafop | 1 | |
| | | Fluazifop-p-butile | 1 | |
| | Dicotiledoni | Pirafufen etile | 14 | Al massimo 1 trattamento all'anno tra pre e post trapianto. Impiegare schermatura. |
| Post raccolta | Graminacee e Dicotiledoni | Glifosate (1) | 9 | Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2l per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. Nel caso di due colture /anno sulla stessa sup. la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture occorre tener conto, sommandole, di tutte le quantità di glifosate distribuite. Solo in miscela. Al massimo 1 intervento all'anno sullo stesso appezzamento. |
| | | 2,4 D | 4 | Solo in miscela. Al massimo 1 intervento all'anno sullo stesso appezzamento. |
| | | Fluazifop p butile | 1 | Al massimo 1 intervento all'anno sullo stesso appezzamento. |

(1) Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Laddove possibile alternare tra loro molecole con differente meccanismo d'azione (non basta cambiare il Prodotto commerciale) cioè che hanno un diverso codice HRAC (vedi tabella coltura e All. IV parte introduttiva).