

DISERBO DELLA PATATA				
(*) <u>Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione (indicate in corsivo, grigio, grassetto): 2</u> Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi)				
EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	HRAC	DOSE E LIMITAZIONE D'USO
Pre semina Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	9	Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2l per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. Nel caso di due colture /anno sulla stessa sup. la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture occorre tener conto, sommandole, di tutte le quantità di glifosate distribuite.
		Acido pelargonico	0	
	Graminacee e Dicotiledoni annuali Cyperus spp.	Napropamide	0	Incorporare al terreno con mezzi meccanici, con l'irrigazione o impiegare dopo abbondanti precipitazioni.
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	<i>Pendimetalin</i> (*)	3	
		Metobromuron	5	
	Dicotiledoni e Graminacee annuali	Prosulfocarb	15	
		Clomazone	13	In miscela con Pendimetalin da non impiegare su colture in serra, tunnel o pacciamate (ad es. con plastica "tessuto non tessuto").
	Graminacee e alcune Dicotiledoni annuali	<i>Flufenacet</i> (*)	15	Scadenza impiego: 10/06/2026. Impiegabile sulla stessa particella 1 volta ogni 3 anni.
	Dicotiledoni	<i>Aclonifen</i> (*)	32	Impiegabile al massimo 1 volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dal fatto che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro. Impiegare dopo la rincalzatura.
		Pirafufen etile	14	Al massimo 1 trattamento all'anno tra pre e post emergenza.
		<i>Diflufenican</i> (*)	12	

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	HRAC	DOSE E LIMITAZIONE D'USO
Post emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico	0	In presenza della coltura usare attrezzature protettive (schermi o campane).
		Rimsulfuron	2	
	Graminacee	Ciclossidim	1	
		Propaquizafop	1	
		Quizalofop-p- etile	1	
		Cletodim	1	
		Fluazifop-p-butile	1	
	Dicotiledoni	Pirafufen etile	14	Al massimo 1 trattamento all'anno tra pre e post emergenza.
Pre raccolta	Disseccamento parte aerea	Pirafufen etile	14	
		Acido pelargonico	0	
		Carfentrazone etile	14	Al massimo 2 litri all'anno.
Post raccolta	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	9	Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2l per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. Nel caso di due colture /anno sulla stessa sup. la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture occorre tener conto, sommandole, di tutte le quantità di glifosate distribuite. Solo in miscela. Al massimo 1 intervento all'anno sullo stesso appezzamento.
		2,4 D	4	Solo in miscela. Al massimo 1 intervento all'anno sullo stesso appezzamento.
		Fluazifop p butile	1	Al massimo 1 intervento all'anno sullo stesso appezzamento.
		Pirafufen etile	14	Al massimo 1 intervento all'anno sullo stesso appezzamento.
	Dicotiledoni	Pirafufen etile	14	Al massimo 1 intervento all'anno sullo stesso appezzamento.

(1) Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Laddove possibile alternare tra loro molecole con differente meccanismo d'azione (non basta cambiare il Prodotto commerciale) cioè che hanno un diverso codice HRAC (vedi tabella coltura e All. IV parte introduttiva).