

DIFESA INTEGRATA DELLO ZUCCHINO										
AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	Sostanza attiva	(1)	Codice gruppo chimico	Codice FRAC IRAC	(2)	Bio	PC	CP	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Mal bianco (<i>Erysiphe cichoracearum</i>) (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	Interventi chimici: i trattamenti devono essere effettuati alla comparsa dei primi sintomi e ripetuti ad intervalli variabili da 7 a 14 giorni in relazione alla persistenza del principio attivo e all'andamento stagionale.	Zolfo		M	M 02		X	X	X	
		Bicarbonato di potassio		-	-		X	X	X	
		COS-OGA		-	-		X	X	X	
		Cerevisane		-	-		X		X	
		Olio di arancio dolce		-	-		X	X	X	
		Prodotti microbiologici		-	-		X	X	X	
		Eugenolo+Geraniolo +Timolo		F7	46		X	X	X	
		Laminarina		P4	P04		X		X	
		Bupirimate	2	A2	8			X	X	
		Penconazolo		G1	3	2		X	X	
		Tetraconazolo						X	X	
		Difenoconazolo	1					X	X	Fra gli IBE candidati alla sostituzione 1 solo trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità.
		Tebuconazolo			X	X				
		Trifloxystrobin		C3	11	2		X	X	
		Azoxystrobin						X	X	
		Fluxapyroxad	2	C2	7			X	X	
		Meptildinocap	2	C5	29			X	X	Impiegabile fino al 30 settembre 2026
		Metrafenone	2	B6	50			X	X	
		Ciflufenamid	2	U	U06			X	X	
Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	Interventi chimici: - intervenire quando sono presenti i sintomi e/o si instaurano le condizioni meteorologiche favorevoli allo sviluppo del fungo Interventi agronomici: - arieggiare le serre; - limitare le irrigazioni (e preferire le irrigazioni a goccia) - eliminare le piante ammalate.	Contro questa avversità al massimo 3 trattamenti all'anno.								
		Prodotti rameici		M	M 01		X	X	X	In un anno al massimo 4 kg/ha di s.a. Non rientra nelle limitazioni dei trattamenti contro l'avversità
		Propamocarb	2	F4	28			X	X	
		Azoxystrobin		C3	11	2		X	X	
		Pyraclostrobin						X	X	
		Cimoxanil	2	U	27			X	X	
		Fosfonato di Potassio		P7	P 07				X	Solo in miscela con Ametoctradin.
		Ametoctradin	2	C8	45			X	X	In pieno campo solo in miscela
		Mandipropamid	2	H5	40	4		X	X	
		Ciazofamid	2	C4	21			X	X	
		Zoxamide	3	B3	22			X	X	

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	Sostanza attiva	(1)	Codice gruppo chimico	Codice FRAC IRAC	(2)	Bio	PC	CP	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Sclerotinia (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	<u>Interventi agronomici:</u> - arieggiare le serre; - limitare le irrigazioni; - eliminare le piante ammalate; - evitare se possibile lesioni alle piante.	Prodotti microbiologici		-	-		X	X	X	
		Isofetamid	1	C2	7				X	
Marciume molle (<i>Phytophthora spp.</i>)	<u>Interventi chimici:</u> Soglia: solo in caso di sintomi. <u>Interventi agronomici:</u> Vedere obblighi al paragrafo “Avvicendamento colturale” in parte speciale - Pratiche agronomiche.	Propamocarb	2	F4	28			X	X	
Marciume radicale (<i>Pythium spp</i>)	<u>Interventi chimici:</u> Intervenire in via preventiva o alla comparsa dei primi sintomi.	Propamocarb	2	F4	28			X	X	
		Prodotti microbiologici		-	-		X		X	
		Fosetil		P7	P 07			X	X	Solo in miscela con propamocarb per trattamento al terreno
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	Normalmente presente solo in coltura protetta.	Prodotti microbiologici		-	-		X	X	X	
		Fenexamide		G3	17	2		X	X	
		Ciprodinil	1	D1	9			X	X	Solo in miscela con fludioxonil
		Isofetamid	1	C2	7				X	
		Fludioxonil	1	E2	12				X	
		Pirimetanil	2	D1	9				X	
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Lachrymans</i> (<i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>)	<u>Interventi chimici:</u> Da effettuare dopo le operazioni colturali che possono causare ferite alle piante. <u>Interventi agronomici:</u> - impiego di seme sano; - concimazioni azotate e potassiche equilibrate; - eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata; - è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici. - ampi avvicendamenti colturali (almeno 4 anni); Vedere obblighi al paragrafo “Avvicendamento colturale” in parte speciale - Pratiche agronomiche.	Prodotti rameici		M	M 01		X	X	X	In un anno al massimo 4 kg/ha di s.a.

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	Sostanza attiva	(1)	Codice gruppo chimico	Codice FRAC IRAC	(2)	Bio	PC	CP	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI (CMV, ZYMV, WMV-2)	Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo dello zucchini ZYMV, virus 2 del mosaico del cocomero WMV-2) i trattamenti aficidi diretti sulla coltura non sono in grado di prevenire la trasmissione dei virus, in quanto l'afide infetto può trasmettere i virus in tempo brevissimo. Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in vivai con sicura protezione dagli afidi. Nel rispetto delle norme generali relative al diserbo eliminare le erbe infestanti all'interno ed attorno alla coltura, che potrebbero essere serbatoio di virus, dei vettori o di entrambi.									
Elateridi Nottue terricole	Trattamento ammesso solo su prescrizione del tecnico	Ammesso soltanto 1 intervento geoinsetticida l'anno indipendentemente dalla coltura.								
		Teflutrin		3A	3					Impiego come geoinsetticida, non rientra nelle limitazioni d'uso per i piretroidi
		Lambda-cialotrina					-	-		
Afidi (<i>Aphis gossypii</i>) (<i>Myzus persicae</i>)	<u>Interventi chimici:</u> infestazioni distribuite a pieno campo o a focolai, osservate in prossimità dell'entrata in produzione. Se sono già stati effettuati dei lanci di <i>Crisopa</i> le s.a. indicate vanno usate unicamente per trattamenti localizzati. Per preservare gli ausiliari e contenere i focolai di infestazione effettuare dei lavaggi con bagnanti (A.G.N.).	Contro questa avversità al massimo 2 trattamenti all'anno								
		Sali potassici di acidi grassi		-	-		X	X	X	Non rientrano nelle limitazioni dei trattamenti contro l'avversità
		Olio minerale		-	-		X	X	X	
		Azadiractina		-	UN		X	X	X	
		Maltodestrina		-	-		X	X	X	
		Prodotti microbiologici		-	-		X		X	Prodotti tossici per i fitoseidi.
		Piretrine pure					X	X	X	
		Lambda-cialotrina	1	3A	3	3		X	X	
		Tau-fluvalinate	2					X		
		Deltametrina	2					X	X	Ammesso solo contro <i>Myzus persicae</i> . Impiegabile solo in serre permanenti.
		Acetamiprid	1	4A	4			X	X	
		Sulfoxaflor		4C	4				X	
		Flupyradifurone	2	4D	4			X	X	
		Flonicamid	1	-	29	2		X	X	
Nottue fogliari (<i>Autographa gamma</i>) (<i>Helicoverpa armigera</i>) (<i>Mamestra brassicae</i>) (<i>Spodoptera esigua</i>) (<i>Udea ferrugalis</i>)	<u>Interventi chimici:</u> Soglia: intervenire dopo aver rilevato la presenza diffusa di larve e dei relativi danni iniziali.	Spinosad	3	-	5		X	X	X	Ammesso solo su <i>Spodoptera</i> e <i>Helicoverpa armigera</i> .
		Azadiractina		-	UN		X	X	X	
		Prodotti microbiologici		-	-		X	X	X	
		Clorantraniliprole		-	28	2		X	X	Non ammesso su <i>Udea</i> .
		Emamectina benzoato		-	6	2		X	X	Ammesso solo su <i>Spodoptera</i> ed <i>Helicoverpa</i>

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	Sostanza attiva	(1)	Codice gruppo chimico	Codice FRAC IRAC	(2)	Bio	PC	CP	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Aleurodidi (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) (<i>Bemisia tabaci</i>)	Interventi chimici: Soglia: presenza. Impiegare trappole cromotropiche gialle per il monitoraggio. Eseguire 4-6 lanci di <i>Encarsia formosa</i> a cadenza settimanale a partire dalla comparsa dei primi adulti di mosca in condizioni favorevoli per il suo sviluppo.	Olio minerale		-	-		X	X	X	
		Prodotti microbiologici		-	-		X		X	
		Olio di arancio dolce		-	-		X	X	X	
		Piretrine pure		3A	3	3	X	X	X	
		Sali potassici di acidi grassi		-	-		X	X	X	
		Terpenoid blend QRD 460		-	-				X	
		Azadiractina		-	UN		X	X	X	Si consiglia di intervenire alla comparsa dei primi attacchi.
		Maltodestrina		-	-		X	X	X	
		Piretrine pure		3A	3	3	X	X	X	
		Piriproxifen	1	7C	7				X	
		Acetamiprid		4A	4	1		X	X	
		Sulfoxaflor		4C	4				X	Impiegabile solo in serre permanenti
		Flupyradifurone	2	4D	4				X	Ammesso solo in serra
		Pyridaben	1	21A	21	2		X	X	
		Flonicamid		-	29	2		X	X	
Tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	Interventi chimici: Soglia: presenza.	Azadiractina		-	UN		X	X	X	Si consiglia di intervenire alla comparsa dei primi attacchi.
		Prodotti microbiologici		-	-		X		X	
		Sali potassici di acidi grassi		-	-		X	X	X	
		Deltametrina	2	3A	3	3		X	X	
		Abamectina		-	6	2			X	Impiegabile solo in serre permanenti

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	Sostanza attiva	(1) Codice gruppo chimico	Codice FRAC IRAC	(2)Bio	PC	CP	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	Interventi chimici: Soglia: presenza. Da effettuarsi in presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate, oppure in concomitanza o in prossimità di trattamenti aficidi. Interventi biologici: Introdurre con uno o due lanci di Phytoseiulus persimilis (8-12 predatori per m²) o Amblyseius andersoni (6 predatori per m²), in relazione al livello di infestazione. Distanziare il lancio di almeno 10 giorni dall'eventuale trattamento aficida.	Contro questa avversità al massimo 1 trattamento						
		Olio minerale	-	-	X	X	X	Non rientrano nelle limitazioni dei trattamenti contro l'avversità
		Sali potassici di acidi grassi	-	-	X	X	X	
		Maltodestrina	-	-	X	X	X	
		Prodotti microbiologici	-	-	X		X	
		Olio di arancio dolce	-	-	X	X	X	
		Terpenoid blend QRD 460	-	-			X	
		Abamectina	-	6	2		X	Impiegabile solo in serre permanenti
		Milbemectina				X	X	
		Exitiadox	10A	10			X	Buona selettività nei confronti dei fitoseidi.
		Tebufenpirad	1			X	X	
		Pyridaben	1	21A	21	2		X
		Fenpiroximate					X	
		Acequinocil	20B	20			X	
Nematode galligeno (<i>Meloidogyne sp.</i>)	Interventi agronomici: - effettuare rotazioni con specie poco sensibili - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - evitare ristagni idrici - utilizzo di pannelli di semi di brassica - utilizzo di ammendanti. Interventi fisici: - solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di mm 0,035 - 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni.	Prodotti microbiologici	-	-	X	X	X	
		Estratto di aglio	-	-	X	X	X	
		Geraniolo			X	X	X	
		Timolo		F7	46	X	X	X
		Azadiractina	-	-	X	X	X	
Sono consentite le miscele quando sono presenti le sostanze attive (s.a.) da sole, con il limite della s.a. più restrittivo.								

(1) Limitazione della singola s.a. va considerata come limite all'anno indipendentemente dall'avversità. Se la colonna è vuota, va preso in considerazione il limite della colonna (2).

(2) Viene riportato il limite complessivo del gruppo chimico. Le sostanze attive facenti parte del medesimo gruppo chimico possono essere utilizzate in alternativa fra loro e il limite deve essere inteso come limite complessivo all'anno indipendentemente dall'avversità.

Le sostanze attive indicate in grassetto sono sostanze candidate alla sostituzione, l'elenco è riportato nell'Allegato III.

L'appartenenza di ogni sostanza attiva al codice gruppo chimico e al codice FRAC IRAC è riportata nell'Allegato IV.

Nella colonna "Bio" sono riportate quelle sostanze attive autorizzate anche in agricoltura biologica che hanno una metodologia di applicazione simile ai prodotti fitosanitari di sintesi.

Le colonne PC e CP indicano per ogni sostanza attiva l'autorizzazione all'utilizzo in pieno campo (PC) o in coltura protetta (CP).