

DISERBO DELLA BARBABIETOLA

(*) **Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione (indicate in corsivo, grigio, grassetto): 3**
 Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate
 (ad esempio una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi)

| EPOCA | INFESTANTI | SOSTANZA ATTIVA | HRAC | DOSE E LIMITAZIONE D'USO |
|---|---|------------------------|------|--|
| Pre semina | Graminacee e Dicotiledoni | Glifosate (1) | 9 | Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. Nel caso di due colture /anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture. |
| | | Acido pelargonico | 0 | |
| Pre emergenza localizzato | Dicotiledoni e graminacee annuali | Metamitron | 5 | Nei suoli con oltre il 70% di sabbia la dose di Metamitron va ridotta del 30%. |
| | | Etofumesate | 15 | Al massimo 1 intervento ogni 3 anni sullo stesso appezzamento. |
| | | Clomazone | 13 | |
| | Graminacee | <i>Triallate</i> (*) | 15 | E' ammesso solo su bietole a semina autunnale in presenza di Amaranti resistenti su prescrizione scritta del tecnico. |
| | | | | |
| Post emergenza <u>microdosi</u> (infestanti stadio cotiledoni) <u>dose ridotta</u> (infestanti oltre le 2 fg. vere) Consigliato l'impiego di <u>olio minerale</u> <u>temperatura</u> e <u>umidità</u> influenzano <u>l'efficacia</u> e la <u>selettività</u> dell'intervento | Dicotiledoni e graminacee annuali | Etofumesate | 5 | Al massimo 1 intervento ogni 3 anni sullo stesso appezzamento. |
| | | Fenmedifam | 5 | Solo in miscela. |
| | | | | Formulato con antidoto |
| | | Metamitron | 5 | |
| | Problemi particolari di Abutilon, <i>Amaranthus</i> , <i>Ammi majus</i> , Polygonum, girasole | <i>Propizamide</i> (*) | 3 | Interventi localizzati. |
| | | Lenacil | 5 | |
| | | Clopiralid | 4 | Interventi localizzati. |

| EPOCA | INFESTANTI | SOSTANZA ATTIVA | HRAC | DOSE E LIMITAZIONE D'USO |
|----------------|--|-----------------------|------|--|
| Post emergenza | Problemi di Graminacee <i>Avena, Alopecurus,</i> <i>Digitaria, Echinocloa,</i> <i>Lolium, Panicum,</i> <i>Setaria, Sorghum</i> | Quizalofop p etile | 1 | |
| | | Ciclossidim | 1 | |
| | | Cletodim | 1 | |
| | | Propaquizafop | 1 | |
| | | Fluazifop p butile | 1 | |
| | Graminacee e Dicotiledoni | Tiencarbazone-metile | 2 | Impiegabile esclusivamente su varietà di barbabietola tolleranti agli erbicidi sulfonilureici inibitori dell'enzima acetolattato sintasi (ALS) secondo le indicazioni delle etichette dei singoli prodotti fitosanitari. Formulato con antidoto |
| | | Foramsulfuron | 2 | Impiegabile esclusivamente su varietà di barbabietola tolleranti agli erbicidi sulfonilureici inibitori dell'enzima acetolattato sintasi (ALS) secondo le indicazioni delle etichette dei singoli prodotti fitosanitari. Formulato con antidoto |
| | Dicotiledoni | Florpyrauxifen-benzyl | 4 | |

(1) Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Laddove possibile alternare tra loro molecole con differente meccanismo d'azione (non basta cambiare il Prodotto commerciale) cioè che hanno un diverso codice HRAC (vedi tabella coltura e All. IV parte introduttiva).