


Flow chart
PDTA del paziente affetto da dolore oncologico

AIOM Linee guida
“Terapia del
Dolore in
oncologia” ed. 2014
www.aiom.it

- Fattori prognostici di dolore difficile**
1. Pazienti più giovani
 2. Dolore neuropatico
 3. Dolore episodico o incident
 4. Distress psicologico
 5. Abuso di sostanze stupefacenti, pregresso o in atto, con possibilità di utilizzo inappropriato degli oppioidi o di precoce tolleranza
 6. Impoverimento cognitivo con difficoltà di valutazione del dolore o ridotta tollerabilità ai trattamenti farmacologici
 7. Elevata intensità del dolore alla presentazione iniziale



National Comprehensive Cancer Network. (NCCN) Clinical Practice Guidelines in Oncology: Adult Cancer Pain. Version 2014 www.nccn.org

National Comprehensive Cancer Network. (NCCN) Clinical Practice Guidelines in Oncology: Adult Cancer Pain. Version 2014 www.nccn.org

- National Comprehensive Cancer Network. (NCCN) Clinical Practice Guidelines in Oncology: Adult Cancer Pain. Version 2013 www.nccn.org
- Raccomandazioni per la gestione del Breakthrough cancer pain (Btcp)

