



## Asteraceae (Compositae)

# *Erigeron sumatrensis* Retz.

### Sinonimi:

*Conyza albida* Willd., *Conyza altissima* Naudin & Debeaux, *Conyza floribunda* Kunth, *Conyza naudinii* Bonnet, *Conyza sumatrensis* (Retz.) E. Walker, *Erigeron albidus* (Willd. ex Spreng.) A. Gray, *Erigeron naudinii* (Bonnet) Humbert

### Nomi comuni

Italiano: Saepola biancastra, Coniza di Sumatra, Saepola di Naudin.

Inglese: Guernsey fleabane, Broad-leaved fleabane, White horseweed, Sumatran fleabane.

Nomi dialettali piemontesi: /



[1] Foto D. Bouvet



[2] Foto D. Bouvet



[3] Foto D. Bouvet



[4] Foto D. Bouvet

### ORIGINE

#### Zona geografica di origine della specie

America meridionale.

#### Periodo e modalità di introduzione

Specie neofita, introdotta accidentalmente in Europa alla fine del XIX secolo; è stata segnalata per la prima volta nel 1878 in Francia, ma è stata a lungo sottostimata per la confusione con *E. canadensis* e *E. bonariensis*.

In Italia è stata raccolta per la prima volta nelle Marche nel 1940 (Bouvet *et al.*, 2013).