

ALLEGATO

**Scheda cartacea per la prescrizione della specialità medicinale KENGREXAL (cangrelor)**

**Indicazioni terapeutiche:** Kengrexal, in co-somministrazione con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la riduzione degli eventi cardiovascolari trombotici nei pazienti adulti con cardiopatia coronarica sottoposti a intervento coronarico percutaneo (PCI, percutaneous coronary intervention) che non hanno ricevuto un inibitore orale del recettore P2Y12 prima della procedura di PCI e nei quali la terapia con gli inibitori del recettore P2Y12 per via orale non è fattibile o auspicabile (Vedere RCP al paragrafo 4.1).

Azienda Sanitaria: \_\_\_\_\_

Unità Operativa richiedente: \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Paziente (nome e cognome): \_\_\_\_\_

Data di nascita: \_\_\_\_\_ Sesso F  M 

Comune di Nascita: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale o Tessera Sanitaria dell'Assistito: \_\_\_\_\_

**La rimborsabilità è limitata alla soddisfazione di almeno una delle seguenti condizioni:**

- Paziente che al momento dell'ingresso in sala di emodinamica non ha la ragionevole possibilità di essere trattato per via orale
- Paziente per cui sia necessario interrompere rapidamente l'effetto del farmaco per ridurre il rischio emorragico in vista di un intervento cardiocirurgico

## PROGRAMMA TERAPEUTICO

Farmaco	Specialità	Dose	Durata
Kengrexal	50 mg polvere per concentrato per soluzione per iniezione/infusione		

*La dose raccomandata di Kengrexal per i pazienti sottoposti a PCI è pari a un bolo endovenoso di 30 microgrammi/kg seguito immediatamente da un'infusione endovenosa di 4 microgrammi/kg/minuto. Il bolo e l'infusione devono essere iniziati prima della procedura e continuati per almeno due ore o per la durata della procedura, a seconda di quale tempo risulti più lungo. A discrezione del medico, l'infusione può essere continuata per una durata totale di quattro ore.*

Nome e Cognome del Medico\*: \_\_\_\_\_

Recapiti del Medico\*: \_\_\_\_\_

**TIMBRO E FIRMA DEL RICHIEDENTE**

\_\_\_\_\_

*\*Kengrexal deve essere somministrato da un medico esperto nella terapia coronarica acuta o nelle procedure di intervento coronarico ed è inteso per l'uso specialistico in situazioni acute in ambito ospedaliero.*

**Nota:** in considerazione del fatto che il trattamento avverrà esclusivamente in condizione di urgenza, la presente scheda potrà essere compilata dopo aver effettuato il trattamento.

18A05702

