

Insetticidi registrati su *Popillia japonica* (azione sugli adulti)

NOME	Sostanza attiva	Uso consentito su	N° trattamenti/dose
DECIS EVO	Deltametrina	Erba medica, trifoglio, graminacee foraggere, floreali (coltura a pieno campo), vivai e ornamentali in pieno campo, pioppo e forestali in vivaio , campi da golf e tappeti erbosi	Da etichetta (non autorizzato in serra per <i>Popillia</i>)
Epik SL	Acetamiprid	Pomacee, drupacee, vite, solanacee, cucurbitacee, lattughe, spinaci, dolcetta, rucola, prodotti baby leaf, erbe fresche, vivai di piante madri di vite, Floreali ed ornamentali pieno campo e serra	Da etichetta

Insetticidi registrati su *Popillia japonica* con azione sulle larve:

ACELEPRYN	Chlorantraniliprole	Tappeti erbosi ornamentali e sportivi	Da etichetta
-----------	---------------------	---------------------------------------	--------------

Insetticidi utilizzabili contro altri insetti ma con azione collaterale sugli adulti di *Popillia japonica*

ATTENZIONE: verificare sempre che l'insetticida che si vuole impiegare sia autorizzato sulla coltura o sulla tipologia di coltivazione (serra, vivaio, pieno campo ecc.) che si vuole trattare.

GRUPPO	Sostanze attive	Azione	Efficacia
PIRETROIDI	Lambda-cialotrina (forestali in vivaio) Cipermetrina (forestali in vivaio) Zeta-Cipermetrina (vivai di piante arboree) Esfenvalerate (forestali in vivaio)	Principale per contatto	In genere i piretroidi presentano una buona efficacia
FENOSSIBENZILETERI	Etofenprox (Colture floreali, ornamentali, vivai e forestali)	Contatto	Discreta
Consentiti in Agricoltura Biologica			
-	Azadiractina – NEEM	Repellente (max 2-3 giorni)	scarsa
-	Piretrine naturali	Contatto	Scarsa
-	Piretrine + Piperonil butossido	Contatto	Discreta
-	Spinosad	Contatto	Scarsa/Moderata
NO prodotto fitosanitario ma Presidio Medico-Chirurgico	Permetrina +tetrametrina + piperonil butossido	Principale per contatto	Buona