

Posologia

Il medico deve prescrivere la formulazione ed il dosaggio più appropriati in base al peso e alla dose.

La posologia raccomandata per adulti, adolescenti e bambini a partire da 2 anni di età è riassunta nella tabella seguente. La dose deve essere somministrata suddivisa in due dosi uguali, a circa 12 ore di distanza.

Dose iniziale raccomandata	Dose di mantenimento raccomandata	Intervallo di dosaggio terapeutico*
<u>Adolescenti e bambini di peso pari o superiore a 50 kg, e adulti</u>		
50 mg/die (o 100 mg/die)**	100 mg/die	50 - 200 mg/die
<u>Adolescenti e bambini di peso compreso tra 20 kg ed inferiore a 50 kg</u>		
1 mg/kg/die (fino a 2 mg/kg/die)**	2 mg/kg/die	1 - 4 mg/kg/die
<u>Bambini di peso compreso tra 10 kg ed inferiore a 20 kg</u>		
1 mg/kg/die (fino a 2,5 mg/kg/die)**	2,5 mg/kg/die	1 - 5 mg/kg/die

* In base alla risposta individuale del paziente, la dose può essere aggiustata nell'intervallo di dosaggio efficace.

** In base alla valutazione della necessità di controllare le crisi da parte del medico

Fare riferimento al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) per indicazioni in merito a controindicazioni, avvertenze speciali/ precauzioni di impiego, posologia e modo di somministrazione.

PROGRAMMA TERAPEUTICO

Farmaco prescritto: Brivaracetam	
Dose/die (mg): _____	
Specificare se:	
<input type="checkbox"/> Prima prescrizione	<input type="checkbox"/> prosecuzione della cura

Data di scadenza del PT: _____

La validità del Piano terapeutico è al massimo di 6 mesi

Data _____

Timbro e firma del medico prescrittore

