

DIFESA INTEGRATA DEL SUSINO

| AVVERSITA' | CRITERI DI INTERVENTO | | Sostanza attiva | (1) | Codice gruppo chimico | Codice FRAC IRAC | (2) | Bio | LIMITAZIONI D'USO E NOTE |
|---|-----------------------|---|---|-----|-----------------------|------------------|-----|------------------------------|--|
| | VINCOLI | CONSIGLI | | | | | | | |
| Monilia <i>(Monilinia laxa, Monilinia fructigena, Monilinia fructicola)</i> | | <u>Interventi agronomici:</u> - all'impianto: scegliere appropriati sesti d'impianto, tenendo conto della vigoria del portinnesto e di ogni singola varietà'. Successivamente proporzionare adeguatamente gli apporti di azoto e gli interventi irrigui in modo da evitare un eccessivo sviluppo vegetativo; -curare il drenaggio. <u>Interventi chimici:</u> - su varietà' ad alta recettività' e' opportuno intervenire in pre-fioritura; - qualora durante la fioritura si verifichino condizioni climatiche favorevoli alla malattia alta umidità' o piovosità') si consiglia di ripetere il trattamento in post-fioritura; - in condizioni climatiche favorevoli alla malattia, sulle cultivar ad elevata suscettibilità e su quelle destinate a medi e lunghi periodi di conservazione si possono eseguire uno o due interventi, ponendo particolare attenzione ai tempi di carenza, in prossimità della raccolta. Intervenire in base alle indicazioni di bollettini determinati da monitoraggi interaziendali. | Contro questa avversità sono ammessi al massimo 5 interventi all'anno | | | | | | |
| | | | Prodotti microbiologici | | - | - | | X | Il loro uso non rientra nelle limitazioni di interventi per l'avversità |
| | | | Polisolfuro di Ca | | M | M 02 | | X | |
| | | | Bicarbonato di potassio | | - | NC | | X | |
| | | | Mefentrifluconazolo | 2 | G1 | 3 | 4 | | Massimo 2 trattamenti/anno (comprese le miscele) indipendentemente dall'avversità con gli IBE candidati alla sostituzione. |
| | | | Difenoconazolo | 2 | | | | | |
| | | | Tebuconazolo | | | | | | |
| | | | Trifloxystrobin | | C3 | 11 | 3 | | Solo in miscela con tebuconazolo |
| | | | Mandestrobin | 2 | | | | | |
| | | | Pyraclostrobin | | | | | Solo in miscela con boscalid | |
| | | | Boscalid | | C2 | 7 | 3 | | Solo in miscela con tebuconazolo |
| | | | Fluopyram | 1 | | | | | |
| | | | Ciprodinil | 1 | D1 | 9 | | | |
| | | | Fludioxonil | 1 | E2 | 12 | | | |
| | | | Fenexamide | 2 | G3 | 17 | 3 | | |
| | | | Fenpirazamine | 2 | | | | | |
| Ruggine <i>(Tranzschelia pruni-spinosae)</i> | | <u>Interventi chimici:</u> su varietà' recettive intervenire tempestivamente alla comparsa delle prime pustole. Successivamente ripetere le applicazioni una o due volte a distanza di 8-12 giorni se permangono condizioni climatiche che mantengano la vegetazione bagnata. Intervenire in base alle indicazioni di bollettini determinati da monitoraggi interaziendali. | Zolfo | | M | M 02 | | X | |
| | | | Prodotti rameici | | M | M 01 | | X | Vedi nota (3). In vegetazione al massimo 4 interventi/anno. |
| | | | Tebuconazolo | 2 | G1 | 3 | 4 | | Massimo 2 trattamenti/anno (comprese le miscele) indipendentemente dall'avversità con gli IBE candidati alla sostituzione. |
| | | | Ditianon | 2 | M | M 09 | | | |

| AVVERSITA' | CRITERI DI INTERVENTO | | Sostanza attiva | (1) | Codice gruppo chimico | Codice FRAC IRAC | (2) | Bio | LIMITAZIONI D'USO E NOTE |
|--|--|--|-------------------------|-----|-----------------------|------------------|-----|-----|--|
| | VINCOLI | CONSIGLI | | | | | | | |
| Corineo (<i>Coryneum beijerinckii</i>) | | Interventi agronomici: - limitare le concimazioni azotate; - asportare e bruciare i rami colpiti. Interventi chimici: Intervenire a caduta foglie e in condizioni climatiche favorevoli alla malattia (alta umidità o piovosità nel periodo primaverile). Intervenire in base alle indicazioni di bollettini determinati da monitoraggi interaziendali. | Prodotti rameici | | M | M 01 | | X | Vedi nota (3). In vegetazione al massimo 4 interventi/anno. |
| | | | Ziram | 1 | M | M 03 | | | Fra Captano e Ziram al massimo 2 trattamenti |
| | | | Captano | 2 | M | M 04 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mal bianco (<i>Sphaeroteca pannosa</i>) | | | Zolfo | | M | M 02 | | X | |
| | | | Polisolfuro di Ca | | M | M 02 | | X | |
| | | | Mefentrifluconazolo | 2 | G1 | 3 | 4 | | |
| Cancro batterico delle drupacee (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Pruni</i>) | | All'impianto: scegliere materiale di propagazione sano e cv poco suscettibili. Interventi agronomici: eliminare durante la potatura le parti infette che dovranno essere bruciate. Interventi chimici: negli impianti colpiti si consiglia di eseguire 3-4 trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni durante la caduta delle foglie. Un ulteriore trattamento può essere effettuato dopo la potatura e/o nelle fasi di ingrossamento gemme. Intervenire in base alle indicazioni di bollettini determinati da monitoraggi interaziendali. | Prodotti rameici | | M | M 01 | | X | Vedi nota (3). In vegetazione al massimo 4 interventi/anno. |
| | | | Prodotti microbiologici | | - | - | | X | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Nerume delle drupacee (<i>Cladosporium carpophilum</i>) | | | Pyraclostrobin | | C3 | 11 | 3 | | |
| | | | Boscalid | | C2 | 7 | 3 | | |
| | | | Zolfo | | M | M 02 | | X | |
| | | | Ditanon | 2 | M | M 09 | | | |
| Cocciniglia di S.Josè (<i>Comstockaspis perniciosa</i>) Cocciniglia bianca (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>) | Soglia su Cocciniglia di S. Josè: - presenza diffusa con insediamenti sui frutti nell'annata precedente. Soglia su Cocciniglia bianca: Presenza diffusa sulle branche principali. | Intervenire a rottura gemme. | Olio minerale | | - | - | | X | |
| | | | Spirotetramat | 1 | - | 23 | 1 | | Impiegabile fino al 30 ottobre 2025. |
| | | | Piriproxifen | 1 | 7C | 7 | | | |
| | | | | | | | | | |

| AVVERSITA' | CRITERI DI INTERVENTO | | Sostanza attiva | (1) | Codice gruppo chimico | Codice FRAC IRAC | (2) | Bio | LIMITAZIONI D'USO E NOTE |
|--|--|---|---|-----|-----------------------|------------------|-----|-----|--|
| | VINCOLI | CONSIGLI | | | | | | | |
| Afide verde (<i>Brachycaudus helychrisi</i>) | Soglia: Infestazione presente su almeno il 10% dei germogli o sui frutticini. | Intervenire in base alle indicazioni di bollettini determinati da monitoraggi interaziendali | Prodotti microbiologici | | - | - | | X | |
| | | | Azadiractina | | - | - | | X | |
| | | | Pirimicarb | 1 | 1A | 1 | | | Si consiglia di sospenderne l'uso a 30 giorni dalla raccolta. |
| | | | Acetamiprid | 2 | 4A | 4 | | | |
| | | | Spirotetramat | 1 | - | 23 | | | Impiegabile fino al 30 ottobre 2025. |
| | | | Flonicamid | 2 | - | 29 | | | |
| | | | Sali potassici di acidi grassi | | - | - | | X | |
| Afide farinoso (<i>Hyalopterus pruni</i>) | Soglia: Presenza. | Intervenire in base alle indicazioni di bollettini determinati da monitoraggi interaziendali. | Contro questa avversità è ammesso al massimo 1 trattamento all'anno. | | | | | | |
| | | | Prodotti microbiologici | | - | - | | X | Il loro uso non rientra nelle limitazioni di interventi per l'avversità |
| | | | Azadiractina | | - | - | | X | |
| | | | Sali potassici di acidi grassi | | - | - | | X | |
| | | | Pirimicarb | 1 | 1A | 1 | | | Si consiglia di sospenderne l'uso a 30 giorni dalla raccolta. |
| | | | Piretrine pure | | 3A | 3 | 4 | X | |
| | | | Acetamiprid | 2 | 4A | 4 | | | |
| Cidia (<i>Cydia funebrana</i>) | Soglia: 10 catture per trappola per settimana. E' opportuno fare riferimento alle catture di numerose trappole. Il momento preciso per l'intervento è indicato dai bollettini tecnici zonali | | Prodotti microbiologici | | - | - | | X | |
| | | | Lambda-cialotrina | 1 | 3A | 3 | 4 | | |
| | | | Deltametrina | 2 | | | | | |
| | | | Spinetoram | 1 | - | 5 | 3 | | Impiegabile fino al 30 dicembre 2025 |
| | | | Spinosad | | - | | | X | |
| | | | Acetamiprid | 2 | 4A | 4 | | | |
| | | | Cloranthraniliprole | 2 | - | 28 | | | |
| | | | Emamectina benzoato | | - | 6 | 2 | | |

| AVVERSITA' | CRITERI DI INTERVENTO | | Sostanza attiva | (1) | Codice gruppo chimico | Codice FRAC IRAC | (2) | Bio | LIMITAZIONI D'USO E NOTE |
|--|---|---|---|-----|-----------------------|------------------|-----|-----|--------------------------------------|
| | VINCOLI | CONSIGLI | | | | | | | |
| Anarsia (<i>Anarsia lineatella</i>) | Soglia: 7 catture per trappola a settimana; 10 catture per trappola in due settimane. Contro le larve della prima generazione intervenire dopo circa 15 gg. dal superamento della soglia; per le successive generazioni intervenire dopo circa 6 gg tenendo in considerazione i trattamenti effettuati contro Cidia. In alternativa trattare su segnalazione dei bollettini determinati sulla base di monitoraggi intraziendali, per comprensori omogenei o di limitata dimensione. | Interventi chimici: Nelle aziende ove non sia possibile l'uso della confusione sessuale si può ricorrere alla lotta con insetticidi, privilegiando l'impiego di <i>Bacillus thuringiensis</i> . | Spinosad | | - | 5 | 3 | X | |
| | | | Clorantraniliprole | 2 | - | 28 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Tignola orientale del pesco (<i>Cydia molesta</i> = <i>Grapholita molesta</i>) | | Si raccomanda l'applicazione del metodo della confusione sessuale ove le caratteristiche del frutteto lo consentono. | Clorantraniliprole | 2 | - | 28 | | | |
| | | | Spinosad | | - | 5 | 3 | X | |
| | | | | | | | | | |
| Tentredini (<i>Hoplocampa flava</i>) (<i>Hoplocampa minuta</i>) | | Trappola di riferimento: cromotropica bianca Tipo Rebell da posizionare prima della fioritura. Soglia indicativa: 50 catture per trappola nel corso della fioritura giustificano la difesa alla caduta petali. | Contro questa avversità è ammesso al massimo 1 trattamento all'anno. | | | | | | |
| | | | Deltametrina | 2 | 3A | 3 | 4 | | |
| | | | | | | | | | |
| Eulia (<i>Argyrotaenia pulchellana</i> = <i>Argyrotaenia ljungiana</i>) | Soglia: - I Generazione: non sono ammessi interventi. - II Generazione : presenza di larve giovani con danni iniziali sui frutti. | | Clorantraniliprole | 2 | - | 28 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Cocciniglia cotonosa (<i>Pseudococcus comstocki</i>) | | | Spirotetramat | 1 | - | 23 | | | Impiegabile fino al 30 ottobre 2025. |
| | | | | | | | | | |
| Metcalfa (<i>Metcalfa pruinosa</i>) | | | Acetamiprid | 2 | 4A | 4 | | | |
| | | | | | | | | | |

| AVVERSITA' | CRITERI DI INTERVENTO | | Sostanza attiva | (1) | Codice gruppo chimico | Codice FRAC IRAC | (2) | Bio | LIMITAZIONI D'USO E NOTE |
|--|--|--|--|-----|--|------------------|-----|-----|---|
| | VINCOLI | CONSIGLI | | | | | | | |
| Orgia (<i>Orgyia antiqua</i>) | Soglia: Presenza di larve giovani. | | | | | | | | |
| Tripidi (<i>Taeniothrips meridionalis</i> ecc.) | | Soglia indicativa: Presenza su cv suscettibili (es. Angeleno). | Contro questa avversità è ammesso al massimo 1 trattamento all'anno | | | | | | |
| | | | Prodotti microbiologici | | - | - | | X | Il loro uso non rientra nelle limitazioni d interventi per l'avversità |
| | | | Azadiractina | | - | - | | X | |
| | | | Sali potassici di acidi grassi | | - | - | | X | |
| | | | Deltametrina | 1 | 3A | 3 | 4 | | Solo in pre-fioritura |
| | | | Lambda-cialotrina | | | | | | |
| Ragnetto rosso dei fruttiferi (<i>Panonychus ulmi</i>) | Soglia: 60% di foglie occupate. | | Contro questa avversità sono ammessi al massimo 2 trattamenti | | | | | | |
| | | | Sali potassici di acidi grassi | | - | - | | X | Il loro uso non rientra nelle limitazioni d interventi per l'avversità |
| | | | Tebufenpirad | 1 | 21A | 21 | | | |
| | | | Fenpiroximate | 1 | | | | | |
| | | | Acequinocil | 1 | 20B | 20 | | | |
| | | | Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>) | | Effettuare monitoraggi periodici per rilevare l'inizio di infestazione; valutare la possibilità di effettuare trattamenti limitati ai filari di bordo. | Acetamiprid | 2 | 4A | 4 |
| Piretrine pure | | 3A | | | | 3 | 4 | X | |
| Deltametrina | 2 | | | | | | | | |
| Sali potassici di acidi grassi | | - | | | | - | | X | |
| Nematodi (<i>Meloidogyne spp.</i>) | | Il susino è molto sensibile agli attacchi di nematodi galligeni nella fase di allevamento in vivaio. Si consiglia pertanto di acquistare piante sane, di controllare lo stato fitosanitario delle radici e di evitare il reimpianto. In presenza di nematodi galligeni si raccomanda di utilizzare come portinnesto il mirabolano prodotto da seme e le sue selezioni. | | | | | | | |
| Sono consentite le miscele quando sono presenti le sostanze attive (s.a.) da sole, con il limite della s.a. più restrittivo. | | | | | | | | | |

(1) Limitazione della singola s.a. va considerata come limite all'anno indipendentemente dall'avversità. Se la colonna è vuota, va preso in considerazione il limite della colonna (2).

(2) Viene riportato il limite complessivo del gruppo chimico. Le sostanze attive facenti parte del medesimo gruppo chimico possono essere utilizzati in alternativa fra loro e il limite deve essere inteso come limite complessivo all'anno indipendentemente dall'avversità.

(3) Al massimo 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2025-2027 e comunque non più di 5 kg/ha in un anno.

Le sostanze attive indicate in grassetto sono sostanze candidate alla sostituzione, l'elenco è riportato nell'Allegato III.

L'appartenenza di ogni sostanza attiva al codice gruppo chimico e al codice FRAC IRAC è riportata nell'allegato IV.

Nella colonna "Bio" sono riportate quelle sostanze attive autorizzate anche in agricoltura biologica che hanno una metodologia di applicazione simile ai prodotti fitosanitari di sintesi.