

DISERBO DEI PICCOLI FRUTTI					
IMPIANTO	ATTIVITA'	INFESTANTI	S.A.	HRAC	DOSE E LIMITAZIONE D'USO
Allevamento e Produzione	Fogliare (post emergenza infestanti)		Glifosate (1) (2) (3)	9	Indipendentemente dal numero di trattamenti sono annualmente ammessi: (1) Fino a 9 l/ ha di superficie trattabile/anno di formulati commerciali a 360 g s.a./l, nei programmi di diserbo in cui si impiegano unicamente erbicidi fogliari. (2) Fino a 6 l/ ha di superficie trattabile/anno di formulati commerciali a 360 g s.a./l, nei programmi di diserbo in cui si impiegano anche erbicidi residuali. (3) Il diserbo deve essere localizzato lungo il bordo della pacciamatura/tunnel/strutture di sostegno e l'area trattata non deve superare il 10% di quella dell'intero impianto.
		Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico (4)	0	
	Spollonante	Graminacee	Quizalofop-p-etile (4)	1	Autorizzato su lampone, mirtillo e ribes.
			Fluazifop - p – butile (4)	1	
			Acido pelargonico (4)	0	Autorizzato su lampone, mora. Assicurarsi che il prodotto non colpisca la coltura e nel caso usare schermature/campane.

(4) Non sono ammessi interventi chimici nell'interfila. Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila, la cui superficie non deve superare il 30 % di quella dell'intero impianto.

Tale riduzione e la conseguente diminuzione di dosaggio non vale per i prodotti impiegati come spollonanti.

Si consiglia l'impiego della pacciamatura per contenere lo sviluppo delle infestanti.